



Rifabutin 用藥指導單張

一、英文(常見)商品名：Mycobutin 150mg/cap

二、中文(常見)商品名：淨核膠囊

三、適應症：治療結核菌及禽結核分枝桿菌感染。

四、用藥方式：

於空腹服用(飯前一小時或飯後二小時)。若有腸胃不適症狀，可於飯後服用此藥。

五、用藥注意事項：

1. 服用此藥前請告訴醫師或藥師，您是否對 rifabutin 或其他藥物過敏。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物(包含非處方藥)。
3. 避免飲酒。
4. 本藥可能會降低口服避孕藥的效果，請採取其他避孕方式。若在服用 rifabutin 期間懷孕，請務必告知醫師。
5. 此藥必須配合療程(約六個月)服藥，才有機會治癒，請遵照醫師與藥師指示服用，即使病況好轉，也不可自行增減藥量、更改用法或停藥。
6. 本藥須與其他抗結核病用藥併服，不可單一服用。

◎本藥可能會使體液、糞便或隱形眼鏡變成橘紅色，待療程結束、停止服藥後即可恢復正常，所以服藥期間應避免配戴隱形眼鏡。

六、此藥品可能引起的副作用及處理方式：

若有下列現象，請立即告知醫師：

常見	發燒，喉嚨痛，心灼熱，消化不良，噁心，嘔吐，胃酸過多，無食慾，腹瀉，皮膚紅疹和癢
少見	活動力及體力缺乏，筋骨酸痛。
罕見	異常疲倦或虛弱，寒顫，眼睛痛，視力變差，口腔出現白點或潰瘍，味覺改變，咳嗽，呼吸短促，下背部或側腰疼痛，膚色蒼白或泛黃、出現紫斑或瘀青，排尿困難或疼痛，黑便或糞便顏色異常，異常出血。

七、忘記服藥時該怎麼辦：

忘記服藥時當天想起請立即服用；切勿於一次服用雙倍劑量。

※參考資料：1. Rifabutin 藥品仿單 2. 務必告知患者用藥資訊網

Service Innovation Caring Alliance

敬祝您 健康平安

衛生福利部胸腔病院藥物諮詢專線 06-2705911 轉 3103 或 3104

