



Ethambutol 用藥指導單張

一、英文(常見)商品名：E-Butol 400/tab

二、中文(常見)商品名：醫肺必妥錠

三、適應症：

通常與其他藥品一起使用來治療肺結核並預防傳染給他人。

四、用藥方式：

通常一天服用一次，15-25mg/kg/day。

五、用藥注意事項：

1. 服用此藥前請告訴醫師或藥師，您是否對 ethambutol 或其他藥物過敏。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物（包含非處方藥），特別是制酸劑及維他命。制酸劑會讓 ethambutol 變的較沒效果，如需服用請於服用制酸劑前一小時或兩小時後服用 ethambutol。
3. 投與本劑有時視力障害出現，投與期間要作視力檢查。
4. 對於糖尿病、酒精中毒、已有視覺障礙產生之患者，不宜使用本劑。
5. Ethambutol 主要經由腎臟排泄，腎功能低下者，須依 ethambutol 在血中的濃度來決定投與之劑量。
6. 本藥須與其他抗結核病用藥併服，不可單一服用。

六、此藥品可能引起的副作用及處理方式：

若有下列現象，請立即告知醫師：喪失食慾、胃不舒服、嘔吐、手足麻痺與刺痛感、視覺模糊、無法辨識紅色與綠色、視力突然改變、皮膚紅疹、發癢。

七、忘記服藥時該怎麼辦：

忘記服藥時當天想起請立即服用；切勿於一次服用雙倍劑量。



※參考資料：

1. Ethambutol 藥品仿單

Service Innovation Caring Alliance

敬祝您 健康平安

衛生福利部胸腔病院藥物諮詢專線 06-2705911 轉 3103 或 3104

